

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷五

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣張元功

欽定四庫全書

備急千金要方卷四

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

婦人方

虛損第十

論方
盜汗附

論曰凡婦人非止臨產須憂至於產後大須將慎危篤之至其在于斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病廣於蒿芘何則產後之病難治于

餘病也婦人產訖五臟虛羸非得將補不可轉瀉若其有病不須駛藥若行駛藥轉更增虛就中更虛向生路遠所以婦人產後百日以來極須慇懃憂畏勿縱心犯觸及即便行房若有所犯必身反強直猶如角弓反張名曰蓐風則是其犯候也若似角弓命同轉燭凡百女人宜好思之苟或在微不慎戲笑作病一朝困卧控告無所縱多出財寶遍處求醫醫者未必解此縱得醫來大命已去何處追尋學者于此一方大須精熟不得同

於常方耳特忌上厠便利宜室中盆上佳

凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之

凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也

凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例後三兩日消息可服澤蘭丸比至月滿丸盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸凡在蓐必須服澤蘭丸

補之服法必七日外不得早服也

凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病竟起迄至于老百方治不能瘥桃仁煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一兩劑以至年內常將服之佳

四順理中圓已產訖可服此方

甘草

一兩

人參

白朮

乾薑

各一兩

右四味為末蜜和丸如梧子服十九稍增至二十九

新生藏虛此所以養臟氣也

桃仁煎治婦人產後百疾諸氣補益悅澤方

桃仁一千二百枚擣令細熟以上好酒一斗五升研
濾三四遍如作麥粥法以極細為佳內長項瓷瓶中
密塞以麴封之內湯中煮一伏時不停火亦勿令火
猛使瓶口常出在湯上無令沉沒熟訖出溫酒服一
合日再雖丈夫亦可服之

石斛地黃煎治婦人虛羸短氣胸逆滿悶風氣方

石斛

甘草

紫苑

各四兩

桃仁

半升

桂心

二兩

大黃

八兩

麥門冬

二升

茯苓

一升

生地黄汁

淳酒

各八升

一方用人參三兩

右十味為末於銅器中炭火上熬內鹿角膠一斤耗得一斗次內飴三斤白蜜三升和調更於銅器中釜上煎微耗以生竹攪無令著耗令相得藥成先食酒服如彈子一丸日三不知稍加至二丸

地黃羊脂煎治婦人產後欲令肥白飲食平調方

生地黄汁

斗一

生薑汁

升五

白蜜

升各五

羊脂

斤二

右四味先煎地黄令得五升次內羊脂令煎減半內薑汁復煎令減合蜜著銅器中煎如飴取雞子大一枚投熱酒中服日三

地黃酒治產後百病未產前一月當預釀之產訖蓐中服之方

地黃汁

升一

好麴

好米

升各二

右三味先以地黃汁漬麴令發準家法醞之至熟封

七日取清服之常使酒氣相接勿令斷絕慎蒜生冷
酢滑猪雞魚一切婦人皆須忌之但夏三月熱不可
合春秋冬並得合服地黃并澤內米中炊合用之一
石十石一準此一升為率先服羊肉當歸湯三劑乃
服之佳

羊肉湯治產後虛羸喘乏自汗出腹中絞痛之方

肥羊肉

三斤
去脂

當歸

姚氏用
蔥白

桂心

甘草

各二
兩

芍藥

三兩
子母秘
錄作豉一升

芍藥

子母秘
錄作蔥白

生薑

各四兩

乾地黄

五兩

右八味㕮咀以水一斗半先煮肉取七升去肉內餘

藥煮取三升去滓分三服不瘥重作

千金翼有蔥白一斤子母秘錄

若胸中微熱加黃芩麥門冬各一兩頭痛加石膏一兩中風加防風一兩大便不利加大黃一兩小便難加葵子一兩上氣欬逆加五味子一兩

猪腎湯治產後虛羸喘乏乍寒乍熱病如瘡狀名蓐勞方

猪腎

一具去脂四破若無用羊腎代

香豉

綿裹

白粳米

蔥白

各一兩

右四味以水三斗煮取五升去滓任情服之不瘥更

作

廣濟方有人參當歸各二兩為六味

羊肉黃耆湯治產後虛乏補益方

羊肉

三斤

黃耆

三兩

大棗

三十枚

茯苓

甘草

當歸

桂心

麥門冬

乾地黄

芍藥

各二兩

右十味以水二斗煮羊肉取一斗去肉內諸藥

煎取三升去滓分三服日三

鹿肉湯治產後虛羸勞損補乏方

鹿肉

四斤

乾地黄

甘草

芍藥

黃耆

芍藥

麥門冬

茯苓

各三兩

人參

當歸

生薑

各二兩

半夏

一升

大棗

二十枚

右十三味㕮咀以水二斗五升煮肉取一斗三升去肉內藥煎取五升去滓分四服日三夜一

麋骨湯治產後虛乏五勞七傷虛損不足臟腑冷熱不

調方

麋骨

一具

遠志

黃耆

芍藥

乾薑

防風

茯苓

一作茯神

厚朴

各三兩

當歸

橘皮

甘草

獨活

芍藥

各二兩

桂心

生薑

各四兩

右十五味㕮咀以水三斗煮麋骨取二斗去骨內藥

煎取五升去滓分五服

當歸芍藥湯治產後虛損逆害飲食方

當歸

一兩半

芍藥

人參

桂心

生薑

乾地黄

甘草

各一兩

大棗

二十枚

右八味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

杏仁湯治產後虛氣方

杏仁

橘皮

白前

人參

各三兩

蘇葉

半夏

各一升

桂心

四兩

生薑

十兩

麥門冬

二兩

右九味呿咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

治婦人產後上氣賁豚氣積勞臟氣不足胸中煩躁關

虛煩第十一方

薤白湯治產後胃中煩熱逆氣方

薤白

半夏

甘草

人參

知母

各二兩

石膏

四兩

栝蒌根

三兩

麥門冬

半升

右八味呿咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服

日三夜二熱甚即加石膏知母各一兩

竹根湯治產後虛煩方

甘竹根細切一斗五升以水二斗煮取七升去滓內
小麥二升大棗二十枚復煮麥熟三四沸內甘草一
兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取瘥短
氣亦服之

人參當歸湯治產後煩悶不安方

人參

當歸

麥門冬

乾地黄

桂心各一兩

大棗二十枚

粳米一升

芍藥四兩

淡竹葉三升

右九味㕮咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓內藥煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當取豉一升以水三斗煮取一升盡服之甚良

甘竹茹湯治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹一升

人參

茯苓

甘草各一兩

黃芩三兩

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服日三知母湯治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶方

知母

三兩

芍藥

黃芩

各二兩

桂心

甘草

各一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服一方不用桂心加生地黃

竹葉湯治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉

麥門冬

各一升

甘草

二兩

生薑

茯苓

各三兩

大棗

十四枚

小麥

三合

右七味㕮咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內諸

藥煮取三升去滓分三服若心中虛悸者加入參二

兩其人食少無穀氣者加粳米五合氣逆者加半夏

二兩

淡竹茹湯治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶亂不解

方

生淡竹茹

一升

麥門冬

各五合

甘草

一兩

生薑

三兩產寶
用乾薑

大棗

十四枚產寶
用石膏三兩

右六味㕮咀以水一斗煮竹茹小麥取八升去滓乃
內諸藥煮取二升去滓分二服羸人分作三服若有
人參入一兩若無人參內茯苓一兩半亦佳人參茯
苓皆治心煩悶及心虛驚悸安定精神有則為良無
自依方服一劑不瘥更作若氣逆者加半夏二兩
赤小豆散治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆三七枚燒作末以冷水和頓服之良

蒲黃散治產後煩悶方

蒲黃以東流水和方寸匕服極良

蜀漆湯治產後虛熱往來心胃煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱晡時輒甚又如微瘧方

蜀漆葉

桂心

甘草

黃芩

各一兩

黃耆

五兩

知母

芍藥

各二兩

生地黄

一斤

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服治寒熱不

傷人

芍藥湯治產後虛熱頭痛方

白芍藥

乾地黄

牡蠣

各五兩

桂心

三兩

右四味㕮咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日
三此湯不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發
熱加黃芩二兩

中風第十二

論方

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜單
行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無疑大

豆紫湯產後大善

大豆紫湯治產後百病及中風痙瘓或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為驗方

大豆

五升

清酒

一斗

右二味以鐵鎗猛火熬豆令極熱焦煙出以酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更合小汗則愈一以去風二則消血結如妊娘傷折胎死在腹中三日服此

酒即瘥

獨活紫湯治產後百日中風瘥口噤不開并治血氣痛

勞傷補腎方

獨活

斤一

大豆

升五

舊酒

升一斗三

石三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減
三升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之去
豆服一升日三夜二

小獨活湯治如前狀方

獨活

八兩

葛根

生薑

各六兩

甘草

二兩

右四味㕮咀以水九升煮取三升去滓分四服微汗

佳

甘草湯治在蓐中風背強不得轉動名曰風痙方

甘草

乾地黄

麥門冬

麻黃

各二兩

栝蒌根

芎藭

黃芩

各三兩

杏仁

五十枚

葛根

半斤

右九味㕮咀以水一斗五升酒五斤合煮葛根取八

升去滓內諸藥煮取三升去滓分再服一劑不瘥更

合良

千金翼崔氏
有前胡三兩

獨活湯治產後中風口噤不能言方

獨活

生薑

各五兩

防風

秦艽

桂心

白朮

甘草

當歸

附子

各二兩

葛根

三兩

防己

一兩

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服

雞糞酒治產後中風及百病并男子中一切風神效方

雞糞

一升熬令黃

烏豆

一升熬令聲絕勿焦

右二味以清酒三升半先淋雞糞次淋豆取汁一服一升溫服取汗病重者凡四五日服之無不愈

竹葉湯治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛之方

淡竹葉

一握

葛根

三兩

防風

二兩

桔梗

甘草

人參

桂心

各一兩

大附子

一枚

生薑

五兩

大棗

十五枚

右十味㕮咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日
三溫覆使汗出若頸項强者用大附子若嘔者加半

夏四兩

防風湯治產後中風背急短氣方

千金翼作
裏急短氣

防風

獨活

葛根

各五兩

當歸

芍藥

人參

甘草

乾薑

各二兩

右八味㕮咀以水九斗煮取三升去滓分三服日三
鹿肉湯治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻方

鹿肉

三斤

芍藥

獨活

秦朮

黃芩

黃耆

各三兩

半夏

一升

乾地黄

桂心

芎藭

各二兩

生薑

六兩

甘草

阿膠

各一兩

茯苓

千金翼作茯神

人參

各四兩

右十五味㕮咀以水二斗煮肉得一斗二升去肉內藥煎取三升去滓內膠令烊分四服日三夜一獨活酒治產後中風方

獨活

一斤

桂心

三兩

秦朮

五兩

右三味呖咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能多飲隨性服

大豆湯治產後卒中風發病倒悶不知人及妊娠挾風兼治在蓐諸疾方

大豆

五升炒
令微焦

葛根

獨活

各八兩

防己

六兩

右四味呖咀以酒一斗二升煮豆取八升去滓內藥煮取四升去滓分六服而日四夜二

五石湯治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫瘕癰眩冒

不知人及濕痺緩弱身體痙攣妊娠百病方

紫石英

三兩

鍾乳

赤石脂

石膏

白石英

牡蠣

人參

黃芩

白朮

甘草

枯薑根

芍藥

桂心

防己

當歸

乾薑

各二兩

獨活

三兩

葛根

四兩

右十八味末五石呖咀諸藥以水一斗四升煮取三升半分五服日三夜二一方有滑石寒水石各二兩

棗二十枚

四石湯治產後卒中風發疾口噤瘕癰悶滿不知人并
緩急諸風毒痺身體痙強及挾胎中風婦人百病方

紫石英

白石英

石膏

赤石脂

各三兩

獨活

生薑

各六兩

葛根

四兩

桂心

芍藥

甘草

芍藥

黃芩

各二兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升半去滓分

五服

小柴胡湯治婦人在蓐得風蓋四肢苦煩熱皆自發露
所為若頭不痛但煩熱與三物黃芩湯頭痛與小柴胡
湯方

柴胡

半斤

黃芩

人參

甘草

各三兩

生薑

二兩

大棗

十二枚

半夏

半斤

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓每服一

升日三服

三物黃芩湯方

黃芩

苦參

各二兩

乾地黄

四兩

右呔咀以水八升煮取二升去滓適寒溫服一升日
二多吐下蟲

甘草湯治產後腹中傷絕寒熱恍惚狂言見鬼此病中
風內絕藏氣虛所為方

甘草

芍藥

各五兩

羊肉

三斤

通草

三兩產寶用當歸

右四味呔咀以水一斗六升煮肉取一斗去肉內藥

煮取六升去滓分五服日三夜二

羊肉湯治產後中風久絕不產月水不利乍赤乍白及男子虛勞冷盛方

羊肉

三斤

成籜大蒜

去皮切

香豉

各三升

右三味以水一斗三升煮取五升去滓內酥一升更煮取三升分溫三服

葛根湯治產後中風口噤瘕痺氣息迫急眩冒困頓并產後諸疾方

葛根

生薑

各六兩

獨活

四兩

當歸

三兩

甘草

桂心

茯苓

石膏

人參

白朮

芎藭

防風

各二兩

石十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三

服日三

防風酒治產後中風方

防風

獨活

各一斤

女萎

桂心

各一兩

茵芋

一兩

石斛

五兩

右六味呿咀以酒二斗漬三宿初服一合稍加至三

四合日三

木防已膏治產後中風方

木防已

半斤

茵芋

五兩

右二味呿咀以苦酒九升漬一宿猪膏四升煎三上
三下膏成炙手摩千遍瘥

治產後中柔風舉體疼痛自汗出者及餘百疾方

獨活

八兩

當歸

四兩

右二味㕮咀以酒八升煮取四升去滓分四服日三

夜一取微汗

葛氏單用獨活小品加當歸若上氣者加桂心二兩不瘥更作

浴湯治產後中風流腫方

鹽

五升熬令赤

雞毛

一把燒作灰

右二味以水一石煮鹽作湯內雞毛灰著湯中適冷暖以浴大良又浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂破

者以紫湯一服瘥神效

紫湯是炒黑豆作者

治產後中風頭面手臂通滿方

大豆三升以水六升煮取一升半去豆澄清更煎取
一升內白朮八兩附子三兩獨活三兩生薑八兩添
水一斗煎取五升內好酒五升合煎取五升去滓分
五服日三夜一間粥頻服三劑

茯神湯治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍恍惚惚
言語錯謬心虛所致方

茯神

四兩

人參

茯苓

各三兩

芍藥

甘草

當歸

桂心

各二兩

生薑

八兩

大棗

三十枚

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三

夜一良

遠志湯治產後忽苦心中衝悸不定志意不安言語錯
誤惚惚憤憤情不自覺方

遠志

麥門冬

人參

甘草

當歸

桂心

各二兩

芍藥

一兩

茯苓

五兩

生薑

六兩

大棗

二十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三
羸者分四服產後得此正是心虛所致無當歸用芎
藭若其人心胃逆氣加半夏三兩

茯苓湯治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍恍惚惚心
中憤憤此皆心虛所致方

茯苓

兩五

甘草

芍藥

桂心

當歸

兩各三

生薑

兩六

麥門冬

斤一

大棗

枚三十

右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三

無當歸可用芎藭若苦心志不定加人參二兩亦可
內遠志二兩若苦煩悶短氣加生竹葉一升先以水
一斗三升煮竹葉取一斗內藥若有微風加獨活三
兩麻黃二兩桂心二兩用水一斗五升若頸項苦急
背膊強者加獨活葛根各三兩麻黃桂心各二兩生
薑八兩用水一斗半

安心湯治產後心衝悸不定恍惚不自知覺言語
錯誤虛煩短氣志意不定此是心虛所致方

遠志

甘草

各二兩

人參

茯神

當歸

芍藥

各三兩

麥門冬

升一

大棗

三十枚

右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三

若苦虛煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升煮竹

葉取一斗內藥若胸中少氣者亦甘草為三兩善

甘草圓治產後心虛不足虛悸心神不安吸吸乏氣或

若恍恍惚惚不自知覺者方

甘草

遠志

菖蒲

各三兩

人參

麥門冬

乾薑

茯苓

各二兩

澤瀉

桂心

各一兩

大棗

五十枚

右十味為末蜜丸如大豆酒服二十九日四五服夜再服不知稍加若無澤瀉以白朮代之若胸中冷增乾薑

人參圓治產後大虚心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜不得眠虛煩少氣方

人參

甘草

茯苓

各三兩

麥門冬

菖蒲

澤瀉

薯蕷

乾薑

各二兩

桂心

一兩

大棗

五十枚

右十味為末以蜜棗膏和丸如梧子未食酒服二十
九日三夜一不知稍增若有遠志內二兩為善若風
氣內當歸獨活三兩亦治男子虛損心悸

大遠志圓治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍恍
惚惚腹中拘急痛夜卧不安胸中吸吸少氣內補傷損
益氣安定心神亦治虛損方

遠志

甘草

乾地黄

桂心

茯苓

麥門冬

人參

當歸

白朮

澤瀉

獨活

菖蒲

各三兩

薯蕷

阿膠

各二兩

乾薑

四兩

右十五味為末蜜和如大豆末食溫酒服二十丸日
三不知稍增至五十丸若大虛身體冷少津液加鍾
乳三兩為善

心腹痛第十三

方

蜀椒湯治產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒

二合

芍藥

當歸

半夏

甘草

桂心

人參

茯苓

各二兩

蜜升

生薑汁

五合

右十味㕮咀以水九升煮椒令沸然後內諸藥煮取二升半去滓內薑汁及蜜煎取三升一服五合漸加至六合禁勿冷食

大巖蜜湯治產後心痛方

乾地黄

當歸

獨活

甘草

芍藥

桂心

細辛

小草

各二兩

吳茱萸

升一

乾薑

三兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升內蜜五合重煮分

三服日三

胡洽不用獨活桂心
小草千金翼不用蜜

乾地黄湯治產後兩脅滿痛兼除百病方

乾地黄

芍藥

各三兩

當歸

蒲黃

各二兩

生薑

五兩

桂心

六兩

甘草

一兩

大棗

二十枚

右八味呖咀以水一斗煮取二升半去滓分服日三
芍藥湯治產後苦腹少痛方

芍藥

兩六

桂心

生薑

各三兩

甘草

兩二

膠飴

兩八

大棗

十二枚

右六味呖咀以水七升煮取四升去滓內膠飴令烱
分三服日三

當歸湯治婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛方

當歸

芍藥

各二兩子母
祕錄作甘草

生薑

兩五

羊肉 斤一

右四味㕮咀以水八升煮羊肉熟取汁煎藥得三升

適寒溫服七合日三

金匱要畧胡洽不用芍藥名小羊肉湯

桃仁芍藥湯治產後腹中疾痛方

桃仁 升半

芍藥

芍藥

當歸

乾漆

桂心

甘草

各二兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服

羊肉湯治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風方

肥羊肉

二斤無羊肉
用麋鹿肉代

茯苓

黃耆

乾薑

各三兩

甘草

獨活

桂心

人參

各二兩

麥門冬

七合

生地黃

五兩

大棗

十二枚

右十一味㕮咀以水二斗煮肉取一斗去肉內藥煮

取二升半分四服日三夜一

千金翼
無乾薑

羊肉當歸湯治產後腹中心下切痛不能食往來寒熱

若中風乏氣力方

羊肉

三斤

當歸

黃芩

肘後用
黃耆

芍藥

防風

肘後用
人參

甘草

各二
兩

芍藥

三
兩

生薑

四
兩

右八味㕮咀以水一斗二升先煮肉熟減半內餘藥

取三升去滓分三服日三

胡洽以黃耆代黃芩白朮
代芍藥名大羊肉湯子母

祕錄以桂心代防風
加大棗十七枚良

羊肉杜仲湯治產後腰痛欬喘方

羊肉

四
斤

杜仲

紫菀

當歸

桂心

白朮

各三
兩

五味子

細辛

款冬花

人參

厚朴

芍藥

附子

草薢

甘草

黃耆
各二兩

生薑

八兩

大棗

三十枚

右十八味㕮咀以水二斗半煮肉取汁一斗五升去肉內藥煎取三升半去滓分五服日三夜二

羊肉生地黃湯治產後三日腹痛補中益藏強氣力消血方

羊肉

三斤

生地黃

切二升

桂心

當歸

甘草

芍藥

人參

各二兩

芍藥

三兩

右八味㕮咀以水二斗煮肉取一斗去肉內藥煎取三升分四服日三夜一

內補當歸建中湯治產後虛羸不足腹中痠痛不止吸少氣或苦小腹拘急痛引腰背不能飲食產後一月日得服四五劑為善令人力壯方

當歸

兩四

芍藥

兩五

甘草

兩二

生薑

兩六

桂心

兩三

大棗

枚十八

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服一日

令盡若大虛內飴糖六兩作湯成內之于火上飴消
若無生薑則以乾薑三兩代之若其人去血過多崩
傷內竭不止加地黃六兩阿膠二兩合八種作湯或
去滓內阿膠若無當歸以芎藭代之

內補芎藭湯治婦人產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中
絞痛方

芎藭

乾地黃

各四兩

芍藥

五兩

桂心

二兩

甘草

乾薑

各三兩

大棗

四十枚

右七味呿咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服
日三不瘥復作至三劑若有寒苦微下加附子三兩
治婦人虛羸少氣傷絕腹中拘急痛崩傷虛竭面目
無色及唾吐血甚良

大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急或溺血少
腹苦痛或從高墮下犯內及金瘡血多內傷男子亦宜
服之方

當歸

續斷

桂心

芍藥

乾薑

麥門冬

各三兩

芍藥

四兩

吳茱萸

一升

乾地黄

六兩

甘草

白芷

各二兩

大棗

四十枚

右十二味㕮咀以酒一斗漬藥一宿明旦以水一斗合煮取五升去滓分五服日三夜二有黃耆入二兩益佳

桂心酒治產後疹痛及卒心腹痛方

桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分三服日三

生牛膝酒治產後腹中苦痛方

生牛膝根五兩以酒五升煮取二升分二服若用乾牛膝根以酒漬之一宿然後可煮

治產後腹中如弦常堅痛無聊賴方

當歸末二方寸匕內蜜一升煎之適寒溫頓服

吳茱萸湯治婦人先有寒冷胸滿痛或心腹刺痛或嘔吐食少或腫或寒或下痢氣息綿愒欲絕產後益劇皆主之方

吳茱萸

二兩

防風

桔梗

乾薑

甘草

細辛

當歸

各十銖

乾地黄

十八銖

右八味㕮咀以水四升煮取一升半去滓分再服

蒲黃湯治產後餘疾胸中少氣腹痛頭疼餘血未盡除腹中脹滿欲死方

蒲黃

生地黄

生薑

各五兩

芎藭

桂心

各一兩

碇硝

二兩

桃仁

二十枚

大棗

十五枚

右八味㕮咀以水九升煮取二升半去滓內芒硝分

三服日三良驗

敗醬湯治產後疼痛引腰腹中如錐刀所刺之方

敗醬

三兩

桂心

芎藭

各一兩半

當歸

一兩

右四味㕮咀以清酒二升水四升微火煮取二升去

滓適寒溫服七合日三食前服之

千金翼只用敗醬一味

芎藭湯治產後腹痛方

芎藭

甘草

各二兩

蒲黃

女萎

各一兩半

芍藥

大黃

各三銖

當歸

十八兩

桂心

桃仁

黃耆

千金翼作黃苓

前胡

各一兩

生地黄

一升

右十二味㕮咀以水一斗酒二升合煮取三升去滓
分四服日三夜一

獨活湯治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活

當歸

桂心

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

二十枚

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服服後
相去如人行十里久再進

芍藥黃耆湯治產後心腹痛方

芍藥

四兩

黃耆

白芷

桂心

生薑

人參

芍藥

當歸

乾地黄

甘草

各二兩

茯苓

三兩

大棗

十枚

右十二味㕮咀以酒水各五升合煮取三升去滓先

食服一升日三

千金翼無人參當歸芍藥地黃茯苓為七味

治產後腹脹痛不可忍者方

煮黍粘根為飲一服即愈

治婦人心痛方

布裏鹽如彈丸燒作灰酒服愈

又方燒秤錘投酒中服亦佳

又方炒大豆投酒中服佳

備急千金要方卷四

欽定四庫全書

備急千金要方卷五

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

婦人方

惡露第十四方

乾地黄湯治產後惡露不盡除諸疾補不足之方

乾地黄

三兩

芎藭

桂心

黃耆

當歸

各二兩

人參

防風

茯苓

細辛

芍藥

甘草

各一兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日

再夜一

桃仁湯治產後往來寒熱惡露不盡方

桃仁

五兩

吳茱萸

二升

黃耆

當歸

芍藥

各三兩

生薑

醅

百鍊

柴胡

各八兩

右八味㕮咀以酒一斗水二升合煮取三升去滓適

寒溫先食服一升日三

澤蘭湯治產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛痛引腰背少氣力方

澤蘭

當歸

生地黃

各二兩

甘草

一兩半

生薑

三兩

芍藥

一兩

大棗

十枚

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服日三墮身欲死服亦瘥

甘草湯治產乳餘血不盡逆搶心胸手足逆冷脈乾腹脹短氣方

甘草

芍藥

桂心

阿膠

各三兩

大黃

四兩

右五味㕮咀以東流水一斗煮取三升去滓內阿膠令烊分三服一服入腹中面即有顏色一日一夜盡此三升即下腹中惡血一二升立瘥當養之如新產者

大黃湯治產後惡露不盡方

大黃

當歸

甘草

生薑

牡丹

芍藥各三兩

吳茱萸一升

右七味㕮咀以水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡加人參二兩名人參大黃湯

柴胡湯治產後往來寒熱惡露不盡方

柴胡

生薑

各八兩

桃仁

五十枚

當歸

黃耆

芍藥

各三兩

吳茱萸

二升

右七味㕮咀以水一斗三升煮取三升去滓先食服

一升日三

千金翼以清酒一斗煮

蒲黃湯治產後餘疾有積盡不去腹大短氣不得飲食
上衝胃脅時時煩憤逆滿手足悁疼胃中結熱方

蒲黃

半兩

大黃

芒硝

甘草

黃芩

各一兩

大棗

三十枚

右六味㕮咀以水五升煮取一升清朝服至日中下
若不止進冷粥半盞即止若不下與少熱飲自下人

羸者半之

千金翼名大黃
湯而不用芒硝

銅鏡鼻湯治產後餘疾惡露不除積聚作病血氣結搏

心腹疼痛方

銅鏡鼻

十八銖
燒末

大黃

二兩
半

芍藥

乾地黄

芎藭

乾漆

芒硝

各二兩

亂髮

雞子
大燒

大棗

三十
枚

右九味㕮咀以水七升煮取二升二合去滓內髮灰

鏡鼻末分三服

小銅鏡鼻湯治如前狀方

銅鏡鼻

十銖
燒末

大黃

甘草

黃芩

芒硝

乾地黄

各二兩

桃仁

五十枚

右七味㕮咀以酒六升煮取三升去滓內鏡鼻末分三服亦治適尸心腹及三十六尸疾

梔子湯治產後兒生處空流血不盡小腹絞痛方

梔子三十枚以水一斗煮取六升內當歸芍藥各二兩蜜五合生薑五兩羊脂一兩於梔子汁中煎取二升分三服日三

生地黃湯治產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛強

消氣息不通方

生地黃

五兩

生薑

三兩

大黃

芍藥

茯苓

細辛

桂心

當歸

甘草

黃芩

各一兩半

大棗

二十枚

右十一味㕮咀以水八升煮取二升半去滓分三服

日三

大黃乾漆湯治新產後有血腹中切痛方

大黃

乾漆

乾地黃

桂心

乾薑

各二兩

右五味㕮咀以水三升清酒五升煮取三升去滓溫服一升血當下若不瘥明旦服一升滿三服病無不瘥

麻子酒治產後血不去方

麻子五升搗以酒一斗漬一宿明旦去滓溫服一升先食服不瘥夜服一升不吐下忌房事一月將養如初產法

升麻湯治產後惡物不盡或經一月半歲一歲方

升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分再服當吐

下惡物勿怪良

治產後惡血不盡腹中絞刺痛不可忍方

大黃

黃芩

桃仁

各三兩

桂心

甘草

當歸

各二兩

芍藥

四兩

生地黃

六兩

石八味呖咀以水九升煮取二升半去滓食前分三

服

治產後漏血不止方

露蜂房

敗船茹

右二味等分作灰取酪若漿服方寸匕日三

又方

大黃

三兩

芒硝

一兩

桃仁

水蛭

蟅蟲

各三枚

甘草

當歸

各二兩

麝蟲

四十枚

右八味㕮咀以水三升酒一升合煮取三升去滓分

三服當下血

又方

桂心

蟾蜍各二兩

枯薑根

牡丹

各三兩

豉

一升

右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服

治產後血不可止者方

乾菖蒲三兩以清酒五升漬煮取三升分再服即止

治產後惡血不除四體並惡方

續骨木二十兩破如算子大以水一斗煮取三升分

三服相去如人行十里久間食粥或小便數或惡血下即瘥此水得三遍煮

治產後下血不盡煩悶腹痛方

羚羊角

燒成灰刮取三兩

芍藥

二兩熬令黃

枳實

一兩細切熬令黃

右三味治下篩煮水作湯服方寸匕日再夜一稍加至二匕

又方鹿角燒成灰搗篩煮豉汁服方寸匕日三夜再稍

加至二匕不能用豉清煮水作湯服之

又方擣生藕取汁飲二升甚驗

又方生地黃汁一升酒三合和溫頓服之

又方赤小豆擣散取東流水和服方寸匕不瘥更服

治產後血瘀痛方

古鐵一斤秤鎚斧頭鐵杵亦得炭火燒令赤內酒五升中稍稍服之神妙

治婦人血瘀心腹積聚乳餘疾絕生小腹堅滿貫臍中

熱腰痛小便不利大便難不下食有伏蟲臃脹癰疽
腫久寒留熱胃管有邪氣方

半夏

一兩六銖

石膏

藜蘆

牡蒙

茯苓

各十八銖

桂心

乾薑

各一兩

烏喙

半兩

巴豆

六十枚
研如膏

右九味為末蜜丸如小豆服二丸日三及治男子疝

病

治婦人血瘕痛方

乾薑

烏賊魚骨

各一兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方末桂心溫酒服方寸匕日三

下痢第十五方

膠蠟湯治產後三日內下諸雜五色痢方

阿膠

黃蘗

各一兩

蠟

如棊子三箇

當歸

一兩半

黃連

二兩

陳廩米

一升

右六味㕮咀以水八升煮米蟹目沸去米內藥煮取

二升去滓內膠蠟令烊分四服一日令盡

桂蜜湯治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛

時時下血方

桂心

甘草

各二兩

乾薑

二兩

附子

一兩

蜜汁

當歸

三兩

赤石脂

十兩

右七味㕮咀以水六升煮取三升去滓內蜜煎一兩

沸分三服日三

治產後下赤白腹中絞痛湯方

芍藥

乾地黄

各五兩

甘草

阿膠

艾葉

當歸

各二兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半去滓內膠令烱分三服

治產後赤白下久不斷身面悉腫方

大豆

微熬

小麥

蒲黃

各一升

吳茱萸

半升

右四味以水九升煮取三升去滓分三服此方神驗亦可以水五升酒一斗煎取四升分四服

治產後痢赤白心腹刺痛方

薤白

一兩

當歸

二兩

酸石榴皮

三兩

地榆根

四兩

粳米

五合

右五味㕮咀以水六升煮取二升半去滓分三服

必効

方加厚朴一兩阿膠人參甘草黃連各一兩半

當歸湯治產後下痢赤白腹痛方

當歸

龍骨

各三兩

乾薑

白朮

各二兩

芎藭

二兩半

甘草

白朮

熟者

附子

各一兩

右八味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服一日
令盡

白頭翁湯治產後下痢兼虛極方

白頭翁

阿膠

秦皮

黃連

甘草

各二兩

黃蘗

三兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半去滓內膠令烱
分三服日三

鼈甲湯治產後早起中風冷泄痢及帶下方

龍甲

如手大

當歸

黃連

乾薑

各二兩

黃藥

長一尺廣三寸

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

千金翼加白頭翁一兩

龍骨圓治產後虛冷下血及穀下晝夜無數兼治產後

惡露不斷方

龍骨

四兩

乾薑

甘草

桂心

各二兩

右四味為末蜜和暖酒服二十九如梧子日三一方

用人參地黃各二兩

阿膠圓治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉不止方

阿膠

四兩

人參

甘草

龍骨

桂心

乾地黃

白朮

黃連

當歸

附子

各二兩

右十味為末蜜丸如梧子溫酒服二十九日三

澤蘭湯治產後餘疾寒下凍膿裏急胸脇滿痛欬嗽嘔
血寒熱小便赤黃大便秘不利方

澤蘭

石膏

各二十
四銖

當歸

甘草

厚朴

各十
八銖

遠志

三十
銖

藁本

芎藭

各十
五銖

乾薑

人參

桔梗

乾地黄

各十
二銖

白朮

蜀椒

白芷

栝子仁

防風

山茱萸

細辛

各九
銖

桑白皮

麻子仁

各半
升

右二十一味㕮咀以水一斗五升先內桑白皮煮取

七升半去之內諸藥煮取三升五合去滓分三服

乾地黃湯治產後下痢方

乾地黃

二兩

白頭翁

黃連

各一兩

蜜蠟

一方寸

阿膠

如手掌大一枚

右五味㕮咀以水五升煮取二升半去滓內膠蠟令

烱分三服日三

千金翼用乾薑一兩

生地黃湯治產後忽著寒熱下痢方

生地黃

五兩

甘草

黃連

桂心

各一兩

大棗

二十枚

赤石脂

二兩

淡竹葉

二升一作竹皮

右七味呿咀以水一斗煮竹葉取七升去滓內藥煮
取二升半分三服日三

藍青圓治產後下痢方

藍青

熬

附子

鬼臼

蜀椒

各一兩半

厚朴

阿膠

甘草

各二兩

艾葉

龍骨

黃連

當歸

各三兩

黃蘗

茯苓

人參

各一兩

右十四味為末蜜和丸如梧子每服二十九空腹飲

下一方用赤石脂四兩

赤石脂圓治產後虛冷下痢方

赤石脂

三兩

當歸

白朮

黃連

乾薑

秦皮

甘草

各二兩

蜀椒

附子

各一兩

右九味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸日三

千金翼作散空腹飲服方寸匕

赤散治產後下痢方

赤石脂

代赭

各三兩

桂心

一兩

右三味治下篩酒服方寸匕日三十日愈

黑散治產後下痢方

麻黃

貫衆

桂心

各一兩

甘草

乾漆

各三兩

細辛

二兩

右六味治下篩酒服五撮日再五日愈麥粥下尤佳

黃散治產後下痢方

黃連

二兩

黃芩

廔蟲

乾地黃

各一兩

右四味治下篩酒服方寸匕日三十日愈

龍骨散治產後痢方

五色龍骨 代赭

赤石脂

黃蘗根皮

蜜炙
令焦

艾

各一
兩半

黃連

二兩

右六味治下篩飲服方寸匕日三

淋渴第十六

栝蒌湯治產後小便數兼渴方

栝蒌根

麥門冬

甘草

黃連

各二兩

人參

生薑

各三兩

大棗

十五枚

桑螵蛸

二十枚

右八味呖咀以水七升煮取二升半分三服

又方治產後渴不止方

栝蒌根

兩四

人參

麥門冬

兩各三

甘草

崔氏不用

乾地黄

兩各二

大棗

枚二十

土瓜根

五兩崔氏用蘆根

右七味呖咀以水一斗二升煮取六升分六服

雞朮脰湯治產後小便數方

雞朮脰

具二三

雞腸

洗三具

乾地黄

當歸

甘草

兩各二

麻黃

兩四

厚朴

人參

兩各三

生薑

五兩

大棗

二十枚

右十味㕮咀以水一斗煮臍脰及腸大棗取七升去滓內諸藥煎取三升半分三服

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆汁或如膠飴每發欲死食不生肌面目萎黃師所不能治方

具齒

四枚燒作木

葵子

一升

石膏

五兩碎

滑石

二兩末

右四味以水七升煮二物取二升去滓內二末及豬脂一合更煎三沸分三服日三不瘥再合服

石韋湯治產後卒淋氣淋血淋石淋方

石韋

黃芩

通草

甘草

各二兩

榆皮

五兩

大棗

三十枚

葵子

二升

白朮

產寶用芍藥

生薑

各三兩

石九味呔咀以水八升煮取一升半分三服

集驗無甘草生

薑崔氏同產寶不用薑棗

葵根湯治產後淋澀方

葵根

二兩

車前子

亂髮

燒灰

大黃

桂心

滑石

各一兩

通草

三兩

生薑

六兩

冬瓜練

七合
作汁

右九味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

千金翼不用冬瓜練

茅根湯治產後淋方

白茅根

一斤

瞿麥

茯苓

各四兩

地脉

人參

各二兩

生薑

三兩

桃膠

甘草

各一兩

鯉魚齒

一百枚

右九味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服

滑石散治產後淋方

滑石

兩五

通草

車前子

葵子

兩各四

右四味治下節酢漿水服方寸匕稍加至二匕

竹葉湯治產後虛渴少氣力方

竹葉

升三

生薑

半夏

兩各三

大棗

枚十四

小麥

合五

甘草

茯苓

人參

兩各一

麥門冬

兩五

右九味呖咀以水九升煮竹葉小麥取七升去滓內

諸藥更煎取二升半一服五合日三夜一

雜治第十七

方灸法

治婦人勞氣食氣胃滿吐逆其病頭重結痛小便赤黃大下氣方

烏頭

黃芩

巴豆

各半兩

半夏

三兩

大黃

八兩

戎鹽

一兩半

廔蟲

桂心

苦參

各十八銖

人參

消石

各一兩

右十一味為末以蜜青牛膽拌和擣三萬杵丸如梧子宿不食酒服五丸安卧須臾當下黃者小腹積

也青者疝也白者內風也如水者留飲也青如粥汁
膈上邪氣也血如腐肉者傷也赤如血者乳餘疾也
如蟲刺者蠱也既下必渴渴飲粥饑食酥糜三日後
當溫食食必肥濃三十日平復亦名破積烏頭丸主
心腹積聚氣悶脹疝瘕內傷瘀血產乳餘疾及諸不足
竹茹湯治婦人汗血吐血尿血下血方

竹茹

升二

人參

芍藥

桔梗

芍藥

當歸

甘草

桂心

各一兩

乾地黃四兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治婦人自少患風頭疼眼眩方

石南一方用石葦

細辛

天雄

茵芋各二兩

薯蕷

防風

賈衆

獨活

蘼蕪各四兩

乾薑

山茱萸各三兩

右十一味㕮咀以酒三斗漬五日初飲二合日三服

後稍稍加之

治婦人經服硫黃丸忽患頭痛項冷冷歇又心胸煩熱
眉骨眼眥癢痛有時生瘡喉中乾燥四體痛癢方

括蕒根

麥門冬

龍膽

各三兩

大黃

二兩

杏仁

二升

土瓜根

八兩

右六味為末蜜丸如梧子大飲服十枚日三後漸加
之

治婦人患癰按時如有三五箇而作水聲殊不得寢食
常心悶方

牽牛子三升治下篩飲服方寸七日一服三十服後
可服好硫黃一兩

治婦人忽與鬼交通方

松脂

二兩

雄黃

末一兩

右二味先烱松脂乃內雄黃末以虎爪攪令相得藥
成取如雞子中黃夜卧以煮燠籠中燒令病人取自
昇其上以被自覆惟出頭勿令過熱及令氣得泄也
厚朴湯治婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱白汁小便俱

出

厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸去滓取桂一尺為末內汁中調和一宿勿食旦頓服之

溫經湯治婦人小腹痛方

茯苓

六兩

土瓜根

芍藥

各三兩

薏苡仁

半斤

右四味㕮咀以酒三升漬一宿旦加水七升煎取二升分再服

半夏厚朴湯治婦人胸滿心下堅咽中帖帖如有炙肉

嚙吐之不出咽之不下方

半夏

升一

厚朴

兩三

茯苓

兩四

生薑

兩五

蘇葉

兩二

右五味㕮咀以水七升煮取四升分四服日三夜一
不瘥頓服一方無蘇葉生薑

治婦人氣方

平旦服烏牛尿日一止

昆布圓治婦人胸中伏氣方

昆布

海藻

芍藥

桂心

白石英

欬冬花

桑白皮

人參

各二兩

栝子仁

茯苓

鍾乳

各二兩半

紫艸

甘草

各一兩

乾薑

一兩六銖

吳茱萸

五味子

細辛

各一兩半

杏仁

百枚

橘皮

蘇子

各五合

右二十味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸日再加

至四十丸

治婦人無故憂恚胸中迫塞氣不下方

芍藥

滑石

黃連

石膏

山茱萸

前胡

各一兩
六銖

大黃

麥門冬

細辛

生薑

各一兩

半夏

十八銖

桂心

半兩

右十二味為末蜜丸如梧子酒服二十九加至三十
九日三服

治婦人斷產方

蠶子故紙方一尺燒為末酒服之終身不產

又方油煎水銀一日勿息空肚服棗一枚永斷不損人

治勞損產後無子陰中冷溢生子門閉積年不瘥身體
寒冷方

防風

一兩半

桔梗

三十銖

人參

一兩

菖蒲

半夏

丹參

厚朴

乾薑

紫菀

杜蘅

各十八銖

秦朮

白欬

牛膝

沙參

各半兩

右十四味為末白蜜和丸如小豆食後服十五丸日
三服不知增至二十九丸有娠止夫不在勿服之服藥

後七日方合陰陽

五加酒治產後癰瘦玉門冷方

五加皮

枸杞子

各二升

蛇牀子

一升

杜仲

各一升

乳牀

半斤

乾地黄

丹參

各二兩

乾薑

三兩

天門冬

四兩

右九味㕮咀以絹袋子盛酒三斗漬三宿一服五合

日再稍加至十合佳

治子門閉血聚腹中生肉癰藏寒所致方

乾漆

半斤

生地黄汁

三升

生牛膝汁

一斤

右三味先搗漆為散內汁中攪微火煎為丸如梧子大酒服三丸日再若覺腹中痛食後服之

治產後勞玉門開而不閉方

硫黃

四兩

吳茱萸

一兩半

菟絲子

一兩六銖

蛇牀子

一兩

右四味為散以水一升煎二方寸匕洗玉門日再洗治產後陰道開而不閉方

石灰一斗熬令燒草以水二斗投之適寒溫入汁中

坐漬之須臾復易坐如常法此方已効千金不傳

黃芩散治婦人陰脫方

黃芩

蝟皮

當歸

各半兩

芍藥

兩一

牡蠣

竹皮

各二兩半

狐莖

一具千金翼用松皮

右七味治下節飲服方寸七日三禁舉重房勞冷食

硫黃散治同前

硫黃

烏澤魚骨

各半兩

五味子

三銖

右三味治下節以粉其上良日再三粉之

當歸散治同前

當歸

黃芩

各二兩

蝟皮

半兩

牡蠣

二兩半

芍藥

一兩六銖

右五味治下篩酒服方寸匕日三服禁舉重良

治產後陰下脫方

蛇床子一升布裹炙熨之亦治產後陰中痛

又方燒人尿為末酒服方寸匕日三

又方燒敝簾頭為灰酒服方寸匕

又方鼈頭五枚燒末以井花水服方寸匕日三

又方

皂莢

半兩

半夏

大黃

細辛

各十八銖

蛇床子

三銖

右五味治下篩用薄絹囊盛大如指內陰中日二易

即瘥

又方

吳茱萸

蜀椒

各一升

戎鹽

如雞子大

右三味皆熬令變色為末以綿裹如半雞子大內陰
中日一易二十日瘥

治婦人陰下脫若脫肛方

羊脂煎訖適冷暖取塗上以鐵精傅脂上多少令調
以火炙布令暖熨肛上漸推內之然後末磁石酒服
方寸匕日三

治陰下挺出方

蜀椒

廣濟方
不用

烏頭

白芨

各半
兩

右三味治未以方寸匕綿裏內陰中入三寸腹中熱
易之日一度明旦乃復著七日愈

當歸湯治產後臟中風冷陰腫痛方

當歸

獨活

白芷

地榆

各三兩

敗醬

千金翼
不用

礬石

各二兩

右六味以水一斗半煮取五升適冷暖稍稍洗陰日

三

又方熟擣桃仁傅之良日三度


灸法月水不利責豚上下并無子灸四滿三十壯穴在丹田兩邊相去各湯升半丹田在臍下二寸是也

婦人胞落頽灸臍中三百壯 又灸身交五十壯三報在臍下橫文中 又灸背脊當臍五十壯 又灸五泉五十壯三報 又灸龍門二十壯三報在玉泉下女人陰內外之際此穴卑令廢不針灸

婦人胞下垂注陰下脫灸俠玉泉三寸隨年壯三報婦人陰冷腫痛灸歸來三十壯三報俠玉泉五寸是其

穴

婦人欲斷產灸右踝上一寸二壯即斷



備急千金要方卷五

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷六

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣張元功

欽定四庫全書

備急千金要方卷六

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

婦人方

補益第十八

論方

論曰凡婦人欲求美色肥白容比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭丸也

栢子仁圓治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏色飲食

減少貌失光澤及產後斷緒無子能久服令人肥白補益方

栢子仁

黃耆

乾薑

紫石英

各二兩

蜀椒

一兩半

杜仲

當歸

甘草

芎藭

各四十銖

厚朴

桂心

桔梗

赤石脂

茯苓

五味子

白朮

細辛

獨活

人參

石斛

白芷

芍藥

各一兩

澤蘭

二兩六銖

藁本

蕪荑

各十
八銖

乾地黄

烏頭

一方作
牛膝

防風

各三
十銖

鍾乳

白石英

各二
兩

右三十味為末蜜和酒服二十九如梧子不知加至

三十九

千金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各
半兩為三十三味并治產後半身枯痺

大五石澤蘭圓治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩急風頭
痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹痛堅逆飲食手
足冷多夢身體痺痛榮衛不和虛弱不能動及產後虛
損並宜服方

鍾乳

禹餘糧

紫石英

甘草

黃耆

各二兩半

石膏

白石英

蜀椒

乾薑

各二兩

澤蘭

二兩六銖

當歸

桂心

芍藥

厚朴

栝子仁

乾地黄

細辛

茯苓

五味子

龍骨

各一兩半

石斛

遠志

人參

續斷

白朮

防風

烏頭

各三十銖

山茱萸

紫苑

各一兩

白芷

藁本

蕪荑

各十銖

石三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加

至三十九

千金翼有陽起石二兩

小五石澤蘭圓治婦人勞冷虛損飲食減少面無光色腹中冷痛經候不調吸吸少氣無力補益溫中方

鍾乳

紫石英

礬石

各一兩半

白石英

赤石脂

當歸

甘草

各四十兩二銖

石膏

陽起石

乾薑

各二兩

澤蘭

二兩六銖

茯苓

龍骨

桂心

各二兩半

白朮

芍藥

厚朴

人參

蜀椒

山茱萸

各三
十銖

栝子仁

藁本

各一
兩

蕪荑

十八
銖

右二十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九加

至三十九日三

增損澤蘭圓治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭

甘草

當歸

芎藭

各四十
二銖

附子

乾薑

白朮

白芷

桂心

細辛

各一
兩

防風

人參

牛膝

各三
十銖

栢子仁

乾地黄

石斛

各三十
六銖

厚朴

藁本

蕪荑

各半
兩

麥門冬

二
兩

右二十味為末蜜和丸如梧子空腹酒下十五丸至
二十九

大補益當歸圓治產後虛羸不足胸中少氣腹中拘急
疼痛或引腰背痛或所下過多血不止虛竭乏氣晝夜
不得眠及崩中面目脫色唇乾口燥亦治男子傷絕或
從高墮下內有所傷藏虛吐血及金瘡傷犯皮肉方

當歸

芍藥

續斷

乾薑

阿膠

甘草

各四兩

白朮

吳茱萸

附子

白芷

各三兩

桂心

芍藥

乾地黄

十兩

右十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九日三夜一不知加至五十丸若有真蒲黃加一升絕妙

白芷圓治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目

脫色腹中痛方

白芷

五兩

乾地黄

四兩

續斷

乾薑

當歸

阿膠

各三兩

附子

一兩

右七味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸日四五服無當歸芎藭代入蒲黃一兩妙無續斷犬薊根代紫石英栢子仁圓治女子遇冬天時行溫風至春夏病熱頭痛熱毒風虛百脉沉重下赤白不思飲食而頭眩心悸酸慚恍惚不能起居方

紫石英

栢子仁

各三兩

烏頭

桂心

當歸

山茱萸

澤瀉

芍藥

石斛

遠志

寄生

菴蓉

乾薑

甘草

各二兩

蜀椒

杜衡

一作杜仲

辛夷

各一兩

細辛

半兩

右十八味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸漸加至
三十九日三服一方用牡蠣一兩

鍾乳澤蘭圓治婦人久虛羸瘦四肢百體煩疼臍下結
冷不能食面目瘀黑憂恚不樂百病方

鍾乳

二兩

澤蘭

三兩六銖

防風

四兩二銖

人參

栢子仁

麥門冬

乾地黄

石膏

石斛

各一兩半

芍藥

甘草

白芷

牛膝

山茱萸

薯蕷

當歸

藁本

各三兩十銖

細辛

桂心

各一兩

蕪荑

半兩

艾葉

十八銖

右二十一味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸加至

四十丸日二服

大澤蘭圓治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或
頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上游風去來目
淚出多涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胸中嘔不止及泄
痢淋瀝或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或
漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或身體皮膚中澀如麻
豆苦癢痰癖結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛目
眩無所見或上氣惡寒洒淅如瘧或喉痺鼻鼈風癰癩
疾或月水不通魂魄不定飲食無味并產後內衄無所

不治服之令人有子方

澤蘭

二兩
六銖

藁本

當歸

甘草

各一兩
十八銖

紫石英

三兩

芎藭

乾地黄

栢子仁

五味子

各一兩
半

桂心

石斛

白朮

一兩
六銖

白芷

蕤蓉

厚朴

防風

薯蕷

茯苓

乾薑

禹餘糧

細辛

卷栢

各一兩

蜀椒

人參

杜仲

牛膝

蛇牀子

續斷

艾葉

蕪荑

各十
八銖

赤石脂

石膏

各二
兩

一有枳實

十八
銖

麥門冬

一兩
半

右三十二味為末蜜和為丸如梧子大酒服二十九
至四十九久赤白痢去乾地黃石膏麥門冬栝子仁
加大麥蘖陳麴龍骨阿膠黃連

各一兩半有鍾
乳加三兩良

小澤蘭圓治產後虛羸勞令身體羸瘦方

澤蘭

二兩
六銖

當歸

甘草

各一兩
十八銖

芎藭

栝子仁

防風

茯苓

各一
兩

白芷

蜀椒

藁本

細辛

白朮

桂心

蕪荑

人參

食茱萸

厚朴

各十八銖

石膏

二兩

右十八味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九日三服稍加至四十丸無疾者依此方春秋二時常服一劑甚良有病虛羸黃瘦者服如前一方無茱萸石

膏有芍藥乾薑

胡洽十五味無栢子仁人參食茱萸除細辛桂心生用外盡熬令變色為末蜜

丸如彈子大內暖酒中服之千金翼無茱萸食茱萸有乾薑一兩

紫石英天門冬圓主風冷在子宮有子常墮落或始為婦便患心痛仍成心疾月水都未曾來服之肥充令人有子方

紫石英

天門冬

禹餘糧

各三兩

蕪荑

烏頭

菰蓉

桂心

甘草

五味子

栢子仁

石斛

人參

澤瀉

一作澤蘭

遠志

杜仲

各二兩

蜀椒

卷栢

寄生

石南

雲母

當歸

一作辛夷

烏賊骨

各一兩

右二十二味為末蜜和為丸梧子大酒服二十丸日

二服加至四十丸

三石澤蘭圓治風虛不足通血脉補寒冷方亦名石斛

澤蘭丸

鍾乳

白石英

各四兩

紫石英

防風

藁本

茯神

各一兩六銖

澤蘭

二兩六銖

黃耆

石斛

石膏

各二兩

甘草

當歸

芎藭

各一兩十八銖

白朮

桂心

人參

乾薑

獨活

乾地黄

各一兩半

白芷

桔梗

細辛

栝子仁

五味子

蜀椒

黃芩

茯苓

芍藥

秦朮

防葵

各一兩

厚朴

蕪荑

各十八銖

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加

至三十丸日二三服

大平胃澤蘭圓治男子女人五勞七傷諸不足定志意

除煩滿手足虛冷羸瘦及月水往來不調不能動等方

澤蘭

細辛

黃耆

鍾乳

各三兩

栝子仁

乾地黄

各二兩半

大黃

前胡

遠志

紫石英

各二兩

芎藭

白朮

蜀椒

各一兩半

白芷

丹參

梔子

一本用枳實

芍藥

桔梗

秦艽

沙參

桂心

厚朴

石斛

苦參

人參

麥門冬

乾薑

各一兩

附子

六兩

吳茱萸

麥蘖

各五合

陳麴

一升

棗

五十枚作膏

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加

至三十丸令人肥健

一本無乾薑有當歸三兩

澤蘭散治產後風虛方

澤蘭

九分

禹餘糧

防風

各十分

石膏

白芷

乾地黄

赤石脂

肉蓯蓉

鹿茸

芎藭

各八分

藁本

蜀椒

白朮

栝子仁

各五分

桂心

甘草

當歸

乾薑

各七分

蕪荑

細辛

厚朴

各四分

人參

三分

右二十二味治下節酒服方寸七日三

月水不通第十九

方

桃仁湯治婦人月水不通方

桃仁

朴硝

牡丹皮

射干

土瓜根

黃芩

各三兩

芍藥

大黃

柴胡

各四兩

牛膝

桂心

各二兩

水蛭

蝨蟲

各七
十枚

右十三味咬咀以水九升煮取二升半去滓分三服
乾薑圓治婦人寒熱羸瘦酸消怠惰胸中支滿肩背脊
重痛腹裏堅滿積聚或痛不可忍引腰小腹痛四肢煩
疼手足厥逆寒至肘膝或煩滿手足虛熱意欲投水中
百節盡痛心下常苦懸痛時寒時熱惡心涎唾喜出每
愛鹹酸甜苦之物身體或如雞皮月經不通大小便苦
難食不生肌方

乾薑

芎藭

茯苓

消石

杏仁

水蛭

蝨蟲

桃仁

蟻螬

麝蟲

各一兩

柴胡

芍藥

人參

大黃

蜀椒

當歸

各二兩

右十六味為末蜜和丸如梧子空心飲下三丸不知

加至十丸

千金翼以療婦人
癥結脅肋下疾

乾漆湯治月水不通小腹堅痛不得近方

乾漆

葶藶

芍藥

細辛

甘草

附子

各一兩

當歸

桂心

芒硝

黃芩

各二兩

大黃

三兩

吳茱萸

一升

右十二味㕮咀以清酒一斗浸一宿煮取三升去滓
內消烱盡分為三服相去如一炊頃

芒硝湯治月經不通方

芒硝

丹砂

末

當歸

芍藥

土瓜根

水蛭

各二兩

大黃

三兩

桃仁

一升

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓內丹砂芒硝

分為三服

治月經不通心腹痛絞欲死通血止痛方

當歸

大黃

芍藥

各三兩

吳茱萸

乾地黄

乾薑

芎藭

蝨蟲

水蛭

各二兩

細辛

甘草

桂心

各一兩

梔子

十四枚

桃仁

十一枚

右十四味呖咀以水一斗五升煮取五升分為五服
一本有牛膝麻子仁各三兩

桃仁湯治月經不通方

桃仁升一

當歸

土瓜根

大黃

水蛭

蟅蟲

芒硝各二兩

牛膝

麻子仁

桂心各三兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升半去滓內消令烊

分為三服

肘後無當歸麻子仁用牡丹射干黃芩芍藥柴胡各三兩為十三味千金翼無蟅蟲

前胡牡丹湯治婦人盛實有熱在腹月經瘀閉不通及勞熱熱病後或因月經來得熱不通方

前胡

牡丹

玄參

桃仁

黃芩

射干

旋復花

栝蒌根

甘草

各二兩

芍藥

茯苓

大黃

枳實

各三兩

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服

乾地黃當歸圓治月水不通或一月再來或隔月不至或多或少或淋瀝不斷或來而腰腹刺痛不可忍四體噓吸不欲食心腹堅痛有青黃黑色水下或如清水不

欲行動舉體沉重惟思眠卧欲食酸物虛乏黃瘦方

乾地黃

三兩

當歸

甘草

各一兩半

牛膝

芍藥

乾薑

澤蘭

人參

牡丹

各一兩六銖

丹參

蜀椒

白芷

黃芩

桑耳

桂心

各一兩

廣蟲

四十枚

芍藥

一兩十八銖

桃仁

二兩

水蛭

螭蟲

各七十枚

蒲黃

二合

右二十一味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下

十五丸漸加至三十丸以知為度

一本無

牡丹圓治婦人女子諸病後月經閉絕不通及從小來不通并新產後瘀血不消服諸湯利血後餘疾未平宜服之取平復方

牡丹

三兩

芍藥

玄參

桃仁

當歸

桂心

各二兩

蟲蟲

水蛭

各五枚

蟻螬

二枚

瞿麥

芎藭

海藻

各一枚

右十二味為末蜜和丸如梧子大酒下十五丸加至

二十丸血盛者作散服方寸匕腹中當轉如沸血自化成水去如小便赤少除桂心用地膚子一兩

黃芩牡丹湯治女人從小至大月經未嘗來顏色萎黃氣力衰少飲食無味方

黃芩

牡丹

桃仁

瞿麥

芍藥

各二兩

芍藥

枳實

射干

海藻

大黃

各三兩

蝨蟲

七十枚

水蛭

五十枚

蟻螯

十枚

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升分三服服兩劑
後灸乳下一寸黑員際各五十壯

治月經不通方

取葶藶一升為末蜜丸如彈子大綿裹內陰中入三
寸每丸一宿易之有汁出止

乾漆圓治月經不通百病不瘥方

乾漆

土瓜根

射干

芍藥

各一兩半

牡丹

牛膝

黃芩

桂心

吳茱萸

大黃

柴胡

各一兩
六銖

桃仁

鼈甲

各二兩

蟬蟲

蟬蛻

各四兩
十枚

水蛭

蝨蟲

各七
十枚

大麻仁

四合

亂髮

雞子大
二枚

菴藺子

二合

右二十味為末以蜜和為丸每日酒下十五丸梧子大漸加至三十丸日三仍用後浸酒服前丸藥

浸酒方

大麻子

三升

菴藺子

二升

桃仁

一升

竈屋焙燥

四兩

土瓜根

射干

各六兩

牛膝

八兩

桂心

四兩

右八味呖咀以清酒三斗絹袋盛藥浸五宿以一盞
下前丸藥甚良或單服之亦好

當歸圓治女人臍下癥結刺痛如蟲所啗及如錐刀所
刺或赤白帶下十二疾腰背疼痛月水或在月前或在
月後方

當歸

葶藶

附子

吳茱萸

大黃

各二兩

黃芩

桂心

乾薑

牡丹

芍藥

各一兩半

細辛

秦椒

柴胡

厚朴

各一兩
六銖

牡蒙

一方
無

甘草

各一
兩

蝨蟲

水蛭

各五
十枚

右十八味為末蜜和丸如梧子大空心酒下十五丸

日再有胎勿服之

鼈甲圓治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周
流痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火灸玉門
冷如風吹經水不通或在月前或在月後服之三十日
便瘥有孕此是河內太守魏夫人方

鼈甲

桂心

各一兩半

蜂房

兩半

玄參

蜀椒

細辛

人參

苦參

丹參

沙參

吳茱萸

各十銖八

麝蟲

水蛭

乾薑

牡丹

附子

皂莢

當歸

芍藥

甘草

防葵

各一兩

蟾蜍

二十枚

蟲蟲

大黃

各一兩六銖

右二十四味為末蜜和丸如梧子大酒下七九日三
稍加之以知為度

又方治婦人因產後虛冷堅結積在腹內月經往來不
時苦腹脹滿繞臍下痛引腰背手足煩或冷熱心悶不
欲食方

鼈甲

一兩半

乾薑

赤石脂

丹參

禹餘糧

當歸

白芷

一方用木

乾地黄

各一兩六銖

代赭

甘草

鹿茸

烏賊骨

殭蠶

各十銖八銖

桂心

細辛

蜀椒

附子

各一兩

右十七味蜜和丸如梧子大空心酒下五丸加至十丸

禹餘糧圓治婦人產後積冷堅癖方

禹餘糧

烏賊骨

吳茱萸

桂心

蜀椒

各二兩半

當歸

白朮

細辛

乾地黄

人參

芍藥

芎藭

前胡

各一兩六銖

乾薑

三兩

礬石

六銖

白薇

紫菀

黃芩

各十八銖

廣蟲

一兩

右十九味為末蜜和丸如梧子空心酒若飲下二十丸日二不知則加之

牡蒙圓治婦人產後十二癥病帶下無子皆是冷風寒氣或產後未滿百日胞絡惡血未盡便利於懸圓上及久坐濕寒入胞裏結在小腹牢痛為之積聚小如雞子大者如拳按之跳手隱隱然或如蟲嚙或如針刺氣時搶心兩脇支滿不能食飲食不消化上下通流或守胃管痛連玉門背膊嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中創欬

引陰痛小便自出子門不正令人無子腰膝疼痛四肢
沉重淫躍一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或
月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不

祥方

亦名紫蓋丸

牡蒙

厚朴

消石

前胡

乾薑

麝蟲

牡丹

蜀椒

黃芩

桔梗

茯苓

細辛

葶藶

人參

芍藥

吳茱萸

桂心

各十八銖

大黃

二兩半

附子

一兩六銖

當歸

半兩

右二十味為末蜜和更搗萬杵丸如梧子大空心酒服三丸日三不知則加之至五六丸下青白黃赤物如魚子者病根出矣

治月經不通結成癥瘕如石腹大骨立宜此破血下癥方

大黃

消石

各六兩

巴豆

蜀椒

各一兩

代赭

柴胡

熬變色

水蛭

丹參

熬令紫色

土瓜根

各三兩

乾漆

芎藭

乾薑

蟲蟲

茯苓

各二兩

右十四味為末巴豆別研蜜和丸如梧子空心酒服

二丸未知加五丸日再服

千金翼無紫胡水蛭丹參土瓜根

大蟲蟲圓治月經不通五七年或腫滿氣逆腹脹癥痛
宜服此數有神驗方

蟲蟲

四百枚

齊螬

一升

乾地黄

牡丹

乾漆

芍藥

牛膝

土瓜根

桂心

兩各四

吳茱萸

桃仁

黃芩

牡蒙

兩各三

茯苓

海藻

兩各五

水蛭

枚三百

芒硝

兩一

人參

半兩

葶藶

合五

右十九味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下七

丸不知加之日三服

千金翼無芒硝人參

桂心酒治月經不通結成癥瘕方

桂心

牡丹

芍藥

牛膝

乾漆

土瓜根

牡蒙

兩各四

吳茱萸

升一

大黃

三兩

黃芩

乾薑

各二兩

蝨蟲

二百枚

蟻蟲

蟻螯

水蛭

各七枚

亂髮灰

細辛

各一兩

殭蠶

五十枚

大麻仁

鼈突墨

三升

乾地黃

六兩

虎杖根

鼈甲

各五兩

菴藹子

二升

右二十四味咀咀以酒四斗分兩甕浸之七日併一

甕盛攪令調還分作兩甕初服二合日二加至三四

合

虎杖煎治腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重月經不通亦

治丈夫病方

取高地虎杖根細剉二斛以水二石五斗煮取一大斗半去滓澄瀝令淨取好醇酒五升和煎令如餠每服一合消息為度不知則加之

又方治月經閉不通結瘕腹大如甕短氣欲死方

虎杖根

百斤去頭去土曝乾切

土瓜根

牛膝

各取汁二斗

右三味咬咀以水一斛浸虎杖根一宿明旦煎取二斗內土瓜牛膝汁攪令調勻煎令如餠每以酒服一

合日再夜一宿血當下若病去但服

桃仁煎治帶下經閉不通方

桃仁

蝨蟲

各一升

朴硝

五兩

大黃

六兩

右四味為末別治桃仁以醇苦酒四升內銅鐺中炭火煎取二升下大黃桃仁蝨蟲等攪勿住手當欲可丸下朴硝更攪勿住手良久出之可丸乃止取一丸如雞子黃投酒中預一宿勿食服之至晡時下如大豆汁或如雞肝凝血蝦蟇子或如膏此是病下也

治月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來下痢羸瘦
此為氣瘕一作血瘕若生肉瘕不可為也療之方

生地黃

三十斤
取汁

乾漆

一斤
為末

右二味以漆末內地黃汁中微火煎令可丸每服酒
下如梧子大三丸不知加之常以食後服

治月經不通甚極閉塞方

牛膝

一斤

麻子

三升
蒸

土瓜根

三兩

桃仁

二升

右四味㕮咀以好酒一斗五升浸五宿一服五合漸

加至一升日三能多益佳

治產後風冷留血不去停結月水閉塞方

桃仁

麻子仁

各二升

菴藺子

一升

右三味㕮咀以好酒三斗浸五宿每服五合日三稍加至一升

五京圓治婦人腹中積聚九痛七害及腰中冷引小腹害食得冷便下方

乾薑

蜀椒

各三兩

附子

一兩

吳茱萸

一升

當歸

狼毒

黃芩

牡蠣
各二兩

右八味為末蜜和丸如梧子初服三九日二加至十丸此出京氏五君故名五京久患冷困當服之

雞鳴紫圓治婦人癥瘕積聚方

皂莢
分

藜蘆

甘草

礬石

烏喙

杏仁

乾薑

桂心

巴豆

各二分

前胡

人參

各四分

代赭

五分

阿膠

六分

大黃

八分

右十四味為末蜜丸如梧子雞鳴時服一九日並一
凡至五丸止仍從一起下白者風也赤者癥瘕也青
微黃者心腹病

遼東都尉所上圓治臍下堅癖無所不治方

恒山

大黃

巴豆

各一分

天雄

二枚

苦參

白薇

乾薑

人參

細辛

狼牙

龍膽

沙參

玄參

丹參

各三分

芍藥

附子

牛膝

茯苓

各五分

牡蒙

四分

藿蘆

六分一方云
二兩三分

右二十味為末蜜丸宿勿食服五丸日三大羸瘦月

水不調當二十五日服之下長蟲或下種種病出二

十五日服中所苦悉愈肌膚盛五十日萬病除斷緒

有子

牡蠣圓治經閉不通不欲飲食方

牡蠣

四兩

大黃

一斤

柴胡

五兩

乾薑

三兩

芎藭

茯苓

各二兩半

蜀椒

十兩

葶藶子

芒硝

杏仁

各五合

水蛭

螭蟲

各半兩

桃仁

七十枚

右十三味為末蜜丸如梧子大飲服七丸日三

當歸圓治腰腹痛月水不通利方

當歸

芎藭

各四兩

蟲蟲

烏頭

丹參

乾漆

各兩

人參

牡蠣

土瓜根

水蛭

各二兩

桃仁

五十枚

右十一味為末以白蜜丸如梧子大酒下三丸日三服

消石湯治血瘕月水留瘀血大不通下病散堅血方

消石

附子

蝨蟲

各三兩

大黃

細辛

乾薑

黃芩

各一兩

芍藥

土瓜根

丹參

代赭

蟻螯

各二兩

大棗

十枚

桃仁

二升

牛膝

一斤

朴硝

四兩

右十六味㕮咀以酒五升水九升漬藥一宿明旦煎

取四升去滓下朴硝消石烱盡分四服相去如炊頃
去病後食黃鴨羹勿見風

備急千金要方卷六